

# 臨時情報

令和2年4月16日

りんご生産者 各位


JAごしょつがる りんご課

## りんご黒星病対策による今後の薬剤散布について

ふじの展葉一週間後頃(1回目)の薬剤散布と、ふじの開花直前(2回目)の薬剤散布までの間隔が空くことから、下記のとおり追加散布を実施して下さい。

### 【1回目】

散布時期	基準薬剤	倍数	1,000ℓ 当たり薬量	収穫前 日数
ふじの展葉 一週間後頃 【4/16～17】頃	1.展着剤 2.マシン油乳剤 3.ダーズバン DF 4.ベフラン液剤	200倍 3,000倍 1,000倍	5ℓ(1/4 缶) 167g×2袋 500ml×2袋	展葉期 45日前 展葉期




### 【追加散布】

散布時期	基準薬剤	倍数	1,000ℓ 当たり薬量	収穫前 日数
【4/24～25】頃	1.展着剤 2.ベフラン液剤 又はストライド顆粒水和剤	1,000倍 1,500倍	500ml×2袋 333g×2袋	展葉期 前日

注1) 追加散布の薬剤は「ベフラン液剤 1,000倍」を使用する。なお、この時期に散布した場合、まめ葉が盃状になるが果実肥大などに影響はない。

注2) ふじの展葉1週間後頃までにベフラン液剤を2回使用している場合は、追加散布には「ストライド顆粒水和剤 1,500倍」を使用する。



### 【2回目】

散布時期	基準薬剤	倍数	1,000ℓ 当たり薬量	収穫前 日数
ふじの開花直前 【5/1～2】頃	1.展着剤 2.オルフィンフロアブル 又はフルーツセイバー 3.アタブロン SC 又はロムダンフロアブル	4,000倍 2,000倍 4,000倍 3,000倍	250ml×1本 250ml×2本 250ml×1袋 335ml×1本	7日前 前日 7日前 前日

降雨前散布を徹底し、散布ムラが無いように適切な量を丁寧に散布しましょう!!