



霜害防止対策を万全に!!

凍霜害の防止にあたっては、テレビやラジオ等の翌朝の予想最低気温に注意し、樹園地での気温の降下具合を観測し、0℃になったら燃焼資材に点火する。

(ア) A重油
4リットル缶を利用する場合、10a当たり30缶以上とする。

(イ) 霜カッター(おがくず・灯油の容量比11:2) 1
霜カッター2kg程度を缶または袋に入れ、10a当たり40〜60個配置する。

(ウ) 散布による防霜資材

霜害発生限界温度

| 生育ステージ | 霜害限界温度 |
|--------|--------|
| 満開期 | -1.5℃ |
| 幼果期 | -1.5℃ |

この資材は、限界温度(被害を受ける温度)を若干下げる効果があると考えられ、農薬との混用も可能である。

| 資材名 | 倍数 | 使用時期 |
|--------|----------|----------------------|
| アイスバリア | 200~500倍 | ●霜・低温の直前 ●基準散布に加用 |

どちらの資材も、肥料が配合されているので、霜がこなくても栄養補給の効果が期待できる。

***注意**
燃焼法を利用する場合は、所轄の消防署に「火災と紛らわしい煙又は火災を発生する恐れがある行為の届出書」などを届出する。

◆腐らん病

園地により、腐らん病が多く見られるところがあるため、もう一度園地を見回り見つけ次第処置する。

クワコナカイガラムシ対策

落花10日〜20日及び7月下旬〜8月上旬に有効な薬剤で胴木洗いをする。

◆追肥

有効土層の浅い園地や、肥料の流しやすいう園地では、肥料の4割を6月末まで追肥として施すのが一般的であるが、花芽の量や樹勢を確認し、樹によっては追肥を中止する。開花量が少ない樹や、樹勢が強い樹に肥料を多く施すと、着色が悪くなるばかりか、ビターピットの発生につながる。

◆良品生産のためには 早期適正着果を!!

良品生産のためには早期適正着果が原則である。摘果時期が遅れたり、成らせすぎた場合は樹勢の衰弱、果実肥大の低下、翌年の花芽形成の不良及び果実品質の低下などが心配される。

そのため、摘花は積極的に行い、また早期摘果に努める。

ただし、霜害を受けた場合は、さび果、奇形果が発生することがあるので症状を確認しながら摘果する。

また、花芽不足により着果量が少ない場合は、えき芽花でも成らせる。




◆摘果

摘果が遅れることは、貯蔵養分を浪費することでもあり、樹に対する負担も大きいので摘果はいずれの品種も早いほど良い。また、摘果は結実量の多い樹から始め、発育が良好で形の良いものを残す。特に下がり枝は小玉が多くなるので強めの摘果を心掛ける。

りんごの標準的な着果程度

| 品 種 | 着果の強さ (残す果実) | 着果率 (%) |
|-------------|--------------|---------|
| 紅 玉 | 3頂芽に1果 | 33.3% |
| つがる・ジョナゴールド | 3.5頂芽に1果 | 28.6% |
| ふじ・王林・千秋 | 4頂芽に1果 | 25.0% |
| 北斗デリシャス系 | 4.5頂芽に1果 | 22.2% |
| 陸 奥 | 5頂芽に1果 | 20.0% |

摘果の強さの違いによる 着果状況 (摘果時)



注) 頂芽数は40頂芽とした。
●は果実を成らせる頂芽、○は頂芽を表す。

◆薬剤による摘果

摘果剤はマイクロデナボン水和剤を使用し、薬液は果実に十分かかるように散布する。本剤散布による落果はおよそ散布10日後頃から始まり、以後10〜14日間継続する。ただし、年によって効果の発現が遅れたり、不十分な場合もあるので、仕上げ摘果は遅れないようにする。

◆使用上の注意

「つがる」「ジョナゴールド」「世界」「千雪」などジェンドロップの多い品種や「もりのかがやき」「名月」に本剤がかかると落ちすぎる可能性があるため、かからないように注意する。

マイクロデナボン水和剤85の使い方

| 品種名 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 希釈倍数 | 10a 当たり 散布量 | 備考 |
|------------------|-------------------------------|---------|--------|-------------------|-------|
| ふじ 奥林斗 北さ 早生ふじ ト | 満開後2週間頃 (ふじでは横径10mm位の時に散布) | 1回 | 1,200倍 | 350ℓ ~ 500ℓ | 展着剤加用 |
| 紅 玉 星の金貨 | 満開後3週間頃 (紅玉では横径16mm位の時に散布) | | | | |

注) ミクロデナボン水和剤は、殺虫剤としての使用ができなくなりました。(摘果剤としてのみ使用する)

つる割れ軽減剤 (ヒオモン水溶剤) の使い方

| 品種名 | 使用目的 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 成分総使用回数 | 希釈倍数 | 10a 当たり 散布量 | 備考 |
|---------|--------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|-------|
| ふじ 早生ふじ | つる割れ軽減 | 満開20~30日後 | 1回 | 3回以内 | 3,000倍 | 300ℓ ~ 600ℓ | 展着剤不要 |

- 注) 1 本剤は単用散布すること。
2 散布後に葉がしおれる症状(エピナスティ)を示すが、1週間後にはほぼ回復する。
3 高温、乾燥時の散布を避ける。(黄変落葉の事例がある)
4 極端に樹勢の弱い樹への散布は避ける。
5 果実肥大が抑制される場合がある。
6 新梢の二次伸長を助長する場合がある。
7 摘果剤(マイクロデナボン水和剤85)を散布した後に本剤を使用した場合、摘果剤の効果が抑制される。

◆つる割れ軽減剤 (ヒオモン水溶剤) の散布

この剤を散布することで、つる割れの発生を軽減することができる。

◆農薬飛散 (ドリフト) に注意

農薬散布時は、りんご以外の他作物に飛散しないように注意する。また、他作物の作付者と十分話し合いをし、飛散防止対策を講ずること。

◆薬剤散布

6月下旬まで、散布間隔は10日以内とし、降雨が予想される場合は前倒し散布や、降雨前にチオノックフロアブル500倍などの特別散布を行う。

- 4回目【ふじの落花10日後頃】(5月21日頃)。
ただし、前日から10日以内)
 1. 展着剤
 2. ユニックス顆粒水和剤 2,000倍
 3. チオノックフロアブル 500倍
 4. スプラサイド水和剤 1,500倍
 5. クレミクス 333倍
又はバイカルティ 1,000倍
- 5回目【ふじの落花20日後頃】(6月1日頃)。
ただし、前日から10日以内)
 1. 展着剤
 2. デランフロアブル 1,500倍

注

ジマンダイセン、カルシウム剤を散布する場合は尿素や葉面散布剤と混用しない。(薬害が発生する可能性がある)りんごの品質、貯蔵性を高めるため、水溶性カルシウム(バイカルティを含む)を年間3回以上散布するようにすること。



*定植後の管理

- ① 深さ10cmの地温15℃以上を確保してから定植する。
- ② 植え穴を土で密閉すると地温が上昇しやすいので注意する。
- ③ 第1花開花前の定植を徹底し、老化苗を回避する。
※老化苗は、ポット底の根周りした根を取り除き、新根の発生を促す。
※深植すると穂木が発根し、青枯病を発病することがある。



*萎凋病対策

近年、定植後に極端な乾燥が続く萎凋病に感染するねぎが見られる。萎凋病は、定植時のベンレート水和剤による根部浸漬(100〜200倍で5分間)が唯一の予防対策となるため必ず実施する。また、雨が少なく干ばつが続く場合は、かん水作業を行う。



*「赤かび」の徹底防除

赤かび病は出穂期から乳熟期にかけて降雨や濃霧が続くと発生しやすい。特に、赤かび病の発生源となる紅色雪腐病の発生が見られる場合は注意する。
赤かび粒が1粒でも混入すると「規格外」となりますので防除を徹底しましょう!

| 農薬名 | 希釈倍数 使用量 | 10 a 当たり の散布量 | 成分総使用回数 | 防除時期 |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| ストロビールフロアブル | 2,000倍 | 100~150 l | 3回以内 | 第1回目防除 開花始め~ 開花期 |
| シルバキュアフロアブル | 2,000倍 | 100~150 l | 2回以内 | 第2回目防除 1回目防除~ 7日後 |
| スミトップ M 粉剤 | | 4 kg | 3回以内 (出穂期以降は2回以内) | |

※例年使用していたトップジンM水和剤・粉剤は、耐性菌が出やすいため運用しない。
※シルバキュアフロアブルはあぶらな科野菜(特に白菜、大根)に薬害を生じることがあるため、付近にある場合はかからないよう注意する。

大豆

***ほ場準備**
大豆は、発芽から生育初期にかけて特に湿害を受けやすいので、排水対策を必ず実施

る。また、ネット発生時期は14~15℃の低温管理とし、さらにトンネル内の風通しをよくする。ただし極端にトンネルを開けると、ネットがよけはいらぬため注意する。

***病害虫防除**
アブラムシ類、つる枯れ病等の早期発見に努め、防除を徹底する。

***灌水**
硬化期(着果後10~15日)を除いて肥大期に雨量が少ない場合は、1株当り5リットル程度の灌水を行う。メロンは水で太ります!

水稲

青天の霹靂の農薬使用成分数は「10成分以内」です!

※「農薬使用成分数」とは、農薬の使用回数ではなく**農薬に含まれている成分数**です。

***水管理**
温暖な日は2cm程度の浅水にし、低温な日は苗が冠水しない程度の4~5cmのやや深水にする。

***除草剤**
除草剤は効果のある雑草の種類やその葉齢等を十分に把握し、使用時期と使用量を守る。また、使用上の注意をよく読んでから使用する。散布後3~4日間は水深を3~5cmを保つ。
●ジャンボ剤は散布時の水深を5~6cmのやや深水とする。また、藻類や表層剥離(チブタ)が多発している場合、拡散が不十分となり効果が劣る場合があるので使用しない。

* (水稲) 中・後期除草剤

水質汚染防止のため除草剤散布後**7日間は落水・かけ流しは行わない!**

| 除草剤名 | 成分数 | 使用量 (製品/10a) | 栽培方法 | 使用時期 | 参考及び注意事項 |
|---------------|-----|--------------------------------|------|--|--|
| マメットSM1キログラム剤 | 3 | 1kg | 移植 | 移植後15日~ノビエ3.5葉期まで | ①藻類、表層剥離(チブタ)にも有効。 ②平均気温16℃以上、稲の葉齢5葉以上で使用。 ③初期除草剤と体系で使用。 ④30℃以上の高温が続くときは下葉枯れ、分げつ抑制などの薬害が生じやすいので使用に注意する。 |
| | | | 直播 | 稲5葉期~ノビエ3.5葉期まで | |
| マメットSMジャンボ | 3 | パック20個(1,000g) | 移植 | 移植後20日~ノビエ3.5葉期まで | ①落水せずに散布できるので省力的である。 ②ノビエ4葉期など大きくなった雑草にも有効。 |
| レフラス1キログラム剤 | 4 | 1kg | 移植 | 移植後14日~ノビエ4葉期まで(但し収穫60日前まで) | |
| バサグラン粒剤 | 1 | 3~4kg | 移植 | 移植後15日~55日(但し収穫60日前まで) | ①広葉雑草のみに有効な剤である。ノビエが混在するほ場では、それらに有効な剤と組み合わせる。 ②落水状態(足跡に水が残っている状態)にして散布し、散布後少なくとも3日間は入水しない。水を落とすことができないほ場では、漏水のない水田に限りできるだけ浅水状態(雑草が水面に出る状態)にして散布し、少なくとも5日間はそのままの状態を保つ。また、散布後7日間は降雨の有無に関わらず落水しない。 ③晴天の持続する時を選んで使用する。 |
| | | | 直播 | 稲3葉期~入水50日後 | |
| バサグラン液剤 | 1 | 500~700ml 〔希釈水量〕 70~100l | 移植 | 移植後15日~55日(但し収穫50日前まで。また、シズイは移植後25日~45日) | ①ノビエのみに有効な剤である。広葉雑草が混在するほ場では、それらに有効な剤と組み合わせる。 ②クリンチャー1キログラム剤の散布は、止め水、湛水状態で均一に行う。 ③クリンチャーEWは、落水又は湛水状態で散布を行う。 ④初期除草剤又は一発剤との体系で使用する。 ⑤クリンチャーEWは展着剤を加えて使用し、散布液の調製は散布当日に行う。 |
| | | | 直播 | 播種後35日~50日 | |
| クリンチャー1キログラム剤 | 1 | 1kg | 移植 | 移植後7日~ノビエ4葉期まで(但し収穫30日前まで) | ①ノビエのみに有効な剤である。広葉雑草が混在するほ場では、それらに有効な剤と組み合わせる。 ②クリンチャー1キログラム剤の散布は、止め水、湛水状態で均一に行う。 ③クリンチャーEWは、落水又は湛水状態で散布を行う。 ④初期除草剤又は一発剤との体系で使用する。 ⑤クリンチャーEWは展着剤を加えて使用し、散布液の調製は散布当日に行う。 |
| | | | 直播 | 播種後10日~ノビエ3葉期まで | |
| クリンチャーEW | 1 | 100ml 〔希釈水量〕 70~100l | 移植 | 移植後20日~ノビエ6葉期まで(但し収穫30日前まで) | ①ノビエ及び広葉雑草に効果が高い。 ②可能な限り落水条件で散布し、散布後少なくとも3日間はそのままの状態を保ち、入水、落水、掛け流しはしない。水を落とすことが出来ないほ場では、漏水のない水田に限りできるだけ浅水状態(雑草が水面に出る状態)にして散布し、少なくとも5日間はそのままの状態を保つ。また、散布後7日間は降雨の有無に関わらず落水しない。 |
| | | | 直播 | 播種後10日~ノビエ5葉期まで | |
| クリンチャーバスメ液剤 | 2 | 1,000ml 〔希釈水量〕 70~100l | 移植 | 移植後15日~ノビエ5葉期まで(但し収穫50日前まで) | ①ノビエ及び広葉雑草に効果が高い。 ②可能な限り落水条件で散布し、散布後少なくとも3日間はそのままの状態を保ち、入水、落水、掛け流しはしない。水を落とすことが出来ないほ場では、漏水のない水田に限りできるだけ浅水状態(雑草が水面に出る状態)にして散布し、少なくとも5日間はそのままの状態を保つ。また、散布後7日間は降雨の有無に関わらず落水しない。 |
| | | | 直播 | 播種後10日~ノビエ5葉期まで | |

し、砕土を丁寧に行う。
改良資材: 苦土タンカル
↓ 60~100kg / 10a

*播種

播種前に、種子処理用殺虫及び鳥害防止と紫斑病予防を兼ねて「クルーザーMAXX」を1kgに8ml塗沫処理する。
播種後に初期除草剤として、プロールプラス乳剤またはラクサー乳剤を発芽前(雑草発生前)までに散布し、水稲等に飛散しないよう土壌処理する。
土壌処理できなかった場合は、大豆の発芽初期に培土を実施する。

*中耕・培土

中耕は、播種後3~4週間頃から実施し、培土の1回目(本葉1.5~2葉期)に初生葉の付け根まで、2回目(本葉3~5葉期)は、第1葉期の付け根まで土寄せする。

*除草剤

中耕・培土で除草対応しきれないほ場では、生育期に除草剤に対応する。
●イネ科雑草・ポルトフロアブル (イネ科雑草3~10葉期)
●一年生広葉雑草・大豆バサグラン液剤 (大豆2葉期~開花前)
※薬害が生じるので十分確認してから使用する。
●一年生雑草・バスタ液剤 (畦間処理・収穫28日前まで)

すいか

*定植後の管理

①定植後の温度管理は、トンネル内の温度を30℃前後に保つようとする。活着後から第1回目の整枝まで片側換気とし、その後から両側換気にする。
②整枝は、親つるの葉数4~5枚で止め、揃った子つるを3本残す。孫つるを株元へ引

つ張りながら、着果節位20節前後まで、2~3回に分けてかき取る。この作業は、開花3日前までに終了する。
※小玉すいかは、定植から14日前後に1~3までの作業を同時に行う。
1. 親つるの葉を10~12枚残し、摘心する。
2. 3節までの長い子つるを除去する。
3. 株元の細かい芽をきれいに除去する。すると、親つるの摘心から8日後に子つるがきれいに揃う。

*温度管理

30℃を目安に温度管理をし、玉の肥大を図る。日中32℃以上が続くようであれば遮光資材やわら等で高温対策を行う。
*玉直し
交配後14~20日を目安に玉を縦や横にして、2~3回玉直しを行う。

*灌水

着果(鶏卵大)を確認したら、天候を考慮しながら、1㎡当り4~5リットルの灌水を着果後30日頃まで、3日に1回行う。その後は、徐々に節水管理し、特に収穫前1週間位は水をきり糖度を高めるようにする。
※黒皮のフックジャックについては、他の普通品種のすいかの雄花でなければ着果しないので気をつけること。

*防除

降雨が続く場合は疫病や炭そ病が発生しやすくなるため、雨の後は殺菌剤(アントラコシグナムWDG1500倍~2000倍液)の散布を行うようとする。

*摘果とマット敷き

摘果は鶏卵大(着果7~10日)の頃に行い、果形の整った素質のよい果実を残す。摘果期を逃し、摘果作業が遅れると、果実の急速な肥大期に入り、株に大きな負担がかかる。また、この時期の摘果は、果皮が柔らかく非常に傷つきやすいので、丁寧に作業を行う。マット敷きは、着果後15日頃までに終えるようにする。

*温度管理

果実肥大期には、最低温度を15~18℃とす

メロン

*定植後の管理

①定植後の温度管理は、トンネル内の温度を30℃以上上げないよう適時に両側か片側を判断して換気する。
なお、メロン苗に直接的に風が当たらないよう注意して換気する。
②整枝は2本仕立てで、2~3回に分けて行い、孫つるは着果節位の手前まで、開花3日前までに終了する。
③交配は、原則としてミツバチ交配とするが、ホームラン等白皮系は、トマトトーン50倍とジベラ50ppm(水2リットル)に対し、トマトトーン2本トジベラ錠4錠を加え、ホルモン処理する。
④かん水は、着果後10日頃(果実の初期肥大期)までに2~3回、硬化期を除いて適時行う。